

Annexe 11 : Analyse par phase (sur base des données qualitatives récoltés) des patients avec 1 seule iso-centre, injection de produit de contraste et sans contention de type masque ou coque : Type 10 N=5. Les durées sont exprimées en minutes et seconde pour la mise en place du cathéter, et en minutes pour les phases ; la marge d'erreur est de +/- 1 minute pour celles-ci.

Analyse	Phase 1	Phase 2	Phase 3		
N=8	Attente du patient en cabine	Préparation et positionnement	Acquisition du ct et marquage	Retour en cabine	Total
J1S8 Sim A 2 RTT Prostate	3m Le questionnaire de contre-indication pour l'injection est déjà rempli par le patient avant (le questionnaire était remplis dans le DPP). Un Rtt prépare tandis que l'autre prend en charge le patient en salle Ct.	9m Dont 5.00 pour la mise en place du cathéter et prise de PSA. Les Rtt X et Z, rentrent le patient dans le CT. Z appelle le médecin directement avant de commencer l'acquisition des « scout-view » ; « <i>on injecte dans deux minutes</i> » dit-il au médecin.	14 Le médecin met 2 minutes pour venir contrôler l'injection.	3	29
J1S4 Sim B 2 Rtt Canal Anal sur Le ventre	6m Le questionnaire est rempli par le patient au Ct. Les Rtt préparent (encodage, table et seringue pour l'injection)	7 cathéter 3.35	15 Le médecin met 2 minutes pour venir.	3 Un Rtt prépare la table pour le suivant et part ensuite reconduire le patient, tandis qu'un autre est parti chercher le suivant.	31
J1S11 Sim C 3Rtt Palliatif Poumon+ Côte Patient en chaise	5m Un RTT rempli le questionnaire avec le patient. Les autres préparent la simulation.	7m Cathéter 1.53 2 Rtt aident le patient à se déshabiller et à se coucher sur la table. <u>Adaptation du positionnement pour le confort du patient (essuie sous les bras car douleur et difficultés pour les tenir relevés et matelas mousse sous le dos)</u>	21 Le médecin met 1 minute pour venir. 1 Rtt ne s'occupe plus de la simul (→2 RTT) Aide pour l'habillage du patient occupant 1 Rtt.		33m
J2S1 Sim D Prostate 2Rtt	6 Le questionnaire est rempli par le patient au ct. Les Rtt préparent la simulation.	14 Cathéter 9.29.	16 m Le médecin met 1m pour venir. Un prise de sang est réalisée.	2m Observation identique que simulation du J1S4.	38
J5S5 2Rtt Sim E Prostate Reprise après préparation.	5m Le questionnaire est déjà rempli. Un Rtt prépare l'injecteur et l'autre arrive après.	11m Cathéter 4.02. Le Rtt veut piquer mais le patient a mal au dos. <u>Adaptation du positionnement Le patient se relève et le Rtt met un matelas mousse.</u>	18m Un rtt appelle le médecin après la réalisation des « scout view » Médecin met 2 minutes pour venir.	4m Observation identique que simulation du J1S4	38

	[3 / 5 / 5 / 6 / 6] Médiane 5 Moyenne 5	[7/7/9/11/14] Médiane : 9 Moyenne : 9.36 Cathéter [1.53 – 9.29] Moy : 4.48 9.36-4.48=4.48	[14-19] Médiane : 16 Moyenne : 16.30	[2-4] Médiane 3	[29-38] Méd 33 Moy 34
--	--	--	---	--------------------	-----------------------------------