

ANNEXE 1: TABLEAU REPRÉSENTATIF DES RÉPONSES ATTENDUES ET LE POURCENTAGE DE BONNE RÉPONSES SUIVANT LE SEXE ET LA LANGUE DU RÉPONDANT

Question posée	Nombre de réponses possibles à la question	Réponse attendue	Personnes francophones (Fédération Wallonie-Bruxelles)		Personnes Néerlandophones (Région Flamande)	
			N et % de bonnes réponses	Femme Homme	N et % de bonnes réponses	Femme Homme
Lequel de ces symptômes est le meilleur pour indiquer qu'une personne est en train d'avoir un arrêt cardiaque ?	4	« Forte Douleur Thoracique »	192 (72%)	127 (65.4%)	129 (82.5%)	106 (87.5%)
Que devez-vous faire pour vérifier la responsivité de la victime ?	4	Secouez ses épaules et lui demander fortement : « Est-ce que vous allez bien ? »	186 (70%)	150 (77.3%)	117 (81.5%)	94 (77.5%)
Quelle est la première chose que vous devez faire lorsqu'une personne ne répond pas ?	4	« Vérifier la respiration de la personne et commencer une RCP si la personne ne respire pas. »	111 (41.5%)	82 (42%)	84 (54%)	71 (58.5%)
Quand vous appelez le 112,	4	« Toutes les réponses ci-	186 (70%)	152 (78%)	129 (82.5%)	100 (82.5%)

quelle information devez-vous vous préparer à donner ?		dessus » (c-à-d : Le lieu, le type d'urgence et votre nom).				
Dans quel cas devez-vous performer une RCP ?	3	« Quand la personne ne respire pas et ne répond pas »	199 (74.5%)	157 (81%)	100 (64%)	81 (67%)
Si la victime respire mais n'est pas réactive, que devez-vous faire ?	3	« La mettre en position latérale de sécurité en vérifiant souvent sa respiration. »	229 (85.5%)	170 (87.5%)	125 (80%)	104 (86%).
Quand quelqu'un ne respire pas, quelle est la pire chose que vous puissiez faire ?	4	« Ne rien faire et attendre que quelqu'un de plus qualifié prenne la situation en main »	164 (61.5%)	117 (60%)	106 (68%)	90 (74%)
La photo ci-dessous montre un défibrillateur externe automatisé ?	3	« Oui »	259 (97%)	188 (97%)	147 (94%)	117 (96.5%)

TABLEAU16: TABLEAU GÉNÉRAL DES RÉPONSES AUX QUESTIONS ET POURCENTAGE DE RÉPONSES ATTENDUES PAR SEXE ET LANGUE DU RÉPONDANT