

Annexe 2 : Tableau des Leviers ou facilitateurs de la déprescription

Chez les patients		Chez les prescripteurs	
Elément d'analyse	Facilitateurs	Elément d'analyse	Facilitateurs
Pertinence des médicaments et de la cessation	Manque d'efficacité des médicaments Effets indésirables	Conscience du problème	Revue, observation, audit et rétroactions
Peurs et perceptions	Inconvénients liés à l'usage des médicaments (ex. coûts) Fait que les médicaments ne sont pas naturels	Inertie	Comportement du prescripteur (à voir) Attitudes et croyances (peur des conséquences de poursuivre le médicament ; attitude positive face à la déprescription ; bénéfices à tirer de la déprescription)
Influences	Influence des médecins, de la famille, des médias, des expériences personnelles antérieures Support disponible	Habiletés à déprescrire	Confiance en soi, expérience de travail, habiletés et formation Information disponible pour quantifier les risques et bénéfices des thérapies ; dialogues ouverts avec les patients ; accès aux spécialistes
Processus de déprescription		Processus de déprescription (faisabilité)	Sentiment que le patient est réceptif et motivé à changer ; pronostic du patient médiocre ;

	Assurance que le médicament peut être repris au besoin		Remboursements adéquats ; accès à du support Surveillance de la part des autorités ; revue de la prescription
--	--	--	--

Source : Adapté de Sirois et Ouellet (2018, pp. 23 et 25)