

Questionnaire Qualtrics: étude sur l'utilisation des antipsychotiques chez les personnes schizophrènes sans-abris

Merci pour le temps que vous accorderez à répondre à ce questionnaire. Il a pour but de comprendre les pratiques actuelles et d'analyser les barrières et facilitateurs à la mise en place de ce type de traitement.

Q1 Sexe

- Homme (1)
- Femme (2)
- Autre (3) _____
-

Q2 Age (en années)

Q3 Professions

- Médecin généraliste (1)
- Psychiatre (2)
- Autre (3) _____
-

Q4 Quelle est votre ancienneté dans votre fonction actuelle?
(en années; 0 si votre expérience est inférieure à 1 an)

Q5 Lieu de pratique




- Hôpital (1)
 - Ambulatoire (2)
 - Autre (3) _____
-

Q6 Région où vous pratiquez

- Bruxelles (1)
- Flandre (2)
- Wallonie (3)

Q7 Pour chaque item, indiquez, selon vous, le pourcentage de patients répondant à ces caractéristiques dans votre patientèle.

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Patients schizophrènes (1)	
Patients sans-abris (2)	
Patients schizophrènes et sans-abris (3)	

Q8 A quelle fréquence prescrivez-vous les traitements suivants à vos patients schizophrènes?
 Jamais Un peu De façon modérée Beaucoup Énormément

Antipsychotiques oraux de première génération ()	
Antipsychotiques oraux de deuxième génération ()	
Antipsychotiques injectables de première génération ()	
Antipsychotiques injectables de deuxième génération ()	

Q9 A quelle fréquence prescrivez-vous les traitements suivants à vos patients schizophrènes sans-abris?
 Jamais Un peu De façon modérée Beaucoup Énormément

0

Antipsychotiques oraux de première génération ()	
Antipsychotiques oraux de deuxième génération ()	
Antipsychotiques injectables de première génération ()	
Antipsychotiques injectables de deuxième génération ()	

Q10 Sur quels éléments vous basez-vous pour le choix du traitement de la schizophrénie?

- Les résultats des recherches scientifiques (1)
- Les guidelines (2)
- Les informations venant de congrès ou de conférences (3)
- Votre expérience clinique (4)
- L'avis des collègues (5)

Barrières et facilitateurs à la mise en place d'antipsychotiques injectables à longue durée d'action







Pour chaque item, indiquez son niveau d'influence dans la mise en place d'antipsychotiques injectables à longue durée d'action. (0, l'item ne joue aucun rôle; 5 l'item joue un rôle prépondérant)

Q11 En lien avec le patient

	0	1	2	3	4	5
La sensibilisation et les connaissances par rapport aux antipsychotiques injectables à longue durée d'action ()						
La préférence du patient ()						
Le coût pour le patient ()						
Les convenances ()						
La stigmatisation ()						
La douleur au site de l'injection ()						
La rencontre régulière d'un soignant ()						
La réduction de l'autonomie ()						
Le sentiment de contrôle de la part des soignants ()						

Q12 En lien avec le soignant

0 1 2 3 4 5

Les connaissances et expériences en lien avec les antipsychotiques injectables à longue durée d'actions ()	
L'attitude et les croyances par rapport aux antipsychotiques injectables à longue durée ()	
La place des antipsychotiques injectables à longue durée d'action dans les guidelines ()	
L'augmentation de la charge de travail ()	
L'identification des patients qui pourraient bénéficier de ce type de traitement ()	
Le coût de la prise en charge ()	

Q13 Si à la suite de ces questions, vous avez envie de soulever des barrières/facilitateurs qui n'ont pas été nommés ou si vous avez d'autres réflexions, n'hésitez pas à nous les partager.
