

# ANNEXE 1

Critères symptomatiques pour le diagnostic  
clinique des troubles d'usage liés aux opioïdes  
(*DSM-5*, 2015)

Critères symptomatiques pour le diagnostic clinique des troubles liés à l'utilisation d'opioïdes		
1	Les opioïdes sont souvent pris en plus grandes quantités ou pendant plus longtemps que prévu.	<p>La présence d'au moins deux de ces symptômes indique un TLUO</p> <p>La gravité du TLUO est défini comme suit :</p> <p><b>LÉGER :</b> Présence de 2 ou 3 symptômes</p> <p><b>MODÉRÉ :</b> Présence de 4 ou 5 symptômes</p> <p><b>GRAVE :</b> Présence de 6 symptômes ou plus</p>
2	Il y a un désir persistant de réduire ou contrôler l'utilisation d'opioïdes et parfois des efforts infructueux pour ce faire.	
3	Beaucoup de temps est consacré aux activités nécessaires pour obtenir des opioïdes, à les consommer ou à se remettre de leurs effets.	
4	État de manque ou envie impérieuse d'utiliser des opioïdes.	
5	Utilisation récurrente d'opioïdes résultant en une incapacité à s'acquitter de ses obligations principales au travail, dans ses études ou chez soi.	
6	Utilisation persistante d'opioïdes en dépit de problèmes interpersonnels ou sociaux, persistants ou récurrents, causés ou exacerbés par les effets des opioïdes.	
7	Des activités sociales, professionnelles ou récréatives importantes sont abandonnées ou réduites à cause de la consommation d'opioïdes.	
8	Utilisation répétée d'opioïdes dans des situations où cela peut être physiquement dangereux.	
9	Poursuite de l'utilisation d'opioïdes en sachant que l'on a un problème physique ou psychologique persistant ou récurrent qui a probablement été causé ou exacerbé par les opioïdes.	
10	Tolérance*, manifestée par l'un des symptômes suivants :	
	Besoin de quantités considérablement accrues d'opioïdes pour obtenir une intoxication ou autre effet recherché	
11	Effet considérablement diminué lorsque la quantité d'opioïdes utilisée reste la même.	
	Sevrage*, manifesté par l'un des symptômes suivants :	
	Syndrome de sevrage caractéristique des opioïdes	
	Des opiacés (ou une substance très proche) sont utilisés pour soulager ou éviter les symptômes de sevrage.	
<p>*Les patients à qui sont prescrits des médicaments opioïdes comme analgésiques pourraient avoir ces deux symptômes (sevrage et tolérance) sans que l'on considère nécessairement qu'ils ont un trouble lié à l'utilisation d'opioïdes.</p>		

(DSM-5, 2015)