

Hygiène Hospitalière : précautions standard
--

Bonjour, étant en dernière année de master en santé publique, je réalise mon mémoire sur l'évaluation des connaissances des référents sur les précautions standard en hygiène hospitalière.

D'avance, je vous remercie de prendre quelques minutes de votre temps pour répondre au questionnaire à choix multiple.

Cochez la bonne réponse

/31

1. Les précautions standard ont été écrites pour guider les professionnels dans leur manière de travailler en respectant les mesures d'hygiène hospitalière. Elles s'adressent préférentiellement

aux infirmiers et aides-soignants car ils sont au chevet du patient

à tous les professionnels de la santé

/1

à tous sauf aux assistantes sociales

2. Les précautions standard doivent être appliquées

pour tous les patients dans tout l'hôpital

pour tous les patients infectés

/1

en chambre du patient

3. L'objectif des précautions standard est de

Protéger les patients

Protéger les soignants et les patients

/1

Réduire le risque de transmission croisée des agents infectieux entre soignants, soigné et environnement ou par exposition à un produit biologique humain

4. Pour éviter la transmission des germes d'une personne à l'autre,

L'hygiène des mains est la mesure la plus efficace

La désinfection de tout le matériel en contact avec le patient est la mesure la plus efficace

/1

Le port du masque est la mesure la plus efficace

5. A l'hôpital, pour le personnel soignant, le port de bijoux est interdit,

mais la montre est autorisée pour les médecins prendre les pulsations

ainsi que les faux ongles et le vernis

sauf pour les secrétaires

/1

mais l'alliance lisse est tolérée

6. La désinfection des mains à la solution hydro-alcoolique

est plus efficace et plus rapide que le lavage des mains


est moins bien tolérée par la peau que le lavage à l'eau et au savon

/1

dure moins que 30 secondes

Annexe 3

7. Numérotez les séquences de désinfection des mains à la solution hydro-alcoolique dans l'ordre chronologique de 1 à 7 (2018 SPF) /3



8. Le lavage des mains à l'eau et au savon est nécessaire

- En entrant dans le service
- Lorsque les mains sont sales /1
- Entre chaque patient

9. Avant de mettre un masque chirurgical

- Je vérifie que le stock est suffisant pour la journée
- Je pratique l'hygiène des mains /1
- Je prépare des lunettes de protection

10. Pour m'assurer du bon positionnement du masque chirurgical

- Je place la barrette rigide sur le nez et je mets la couleur foncée vers l'extérieur
- Je place la barrette rigide sur le nez et je mets les plis plongeant vers l'extérieur et le bas /1
- Je place la barrette rigide sur le nez et je mets les plis plongeant vers l'extérieur et le haut

11. Je porte le masque chirurgical

- maximum 4h consécutives
- maximum 8h consécutives
- maximum 4h consécutives à condition qu'il ne soit pas souillé /1

12. Parmi les actes ci-dessous, lequel n'est pas aérosolisant ?

- intubation
- soins en dentisterie
- aspiration endotrachéale
- V oxygénation par lunettes (3L/min) /1

13. En période Covid 19, le patient se trouve dans son lit et je dépose son plateau sur la table, située à 2m du patient. Dois-je porter un EPI et si oui lequel ?

- V Oui, je dois porter un masque chirurgical
- Oui, je dois porter un masque chirurgical, une visière ou des lunettes, un tablier et des gants /1
- Non, je ne dois rien porter de spécial

Annexe 3

14. Le médecin réalise une fibroscopie, je lui prépare le matériel suivant : (plusieurs réponses possibles)
- Gants
 - Masque chirurgical
 - Masque FFP2
 - Blouse
 - Visière ou lunettes
15. Je dois réaliser une hygiène des mains après avoir enlevé mes gants
- Vrai
 - Faux
16. L'utilisation de la douchette pour rincer une panne est proscrite
- Vrai
 - Faux
17. Le patient présente des symptômes respiratoires, il doit : (plusieurs réponses possible)
- Utiliser un mouchoir à usage unique lors d'éternuement
 - Tousser ou éternuer au niveau de son coude plutôt que dans la main
 - Réaliser l'hygiène des mains avant de se moucher
 - Porter un masque

Question ouverte

Quelles sont les 5 indications à l'hygiène des mains ?

1. Avant contact patient
2. Après contact patient
3. Avant acte propre/invasif
4. Après exposition à des liquides biologiques
5. Après contact avec l'environnement du patient